


## L'envahissement rapide du bassin Formans/ Morbier

Les crues torrentielles de l'été 1993 vont marquer un tournant important dans la propagation des renouées sur l'ensemble du bassin. Avant cette date quelques îlots non significatifs sont mentionnés çà et là. L'invasion réelle démarre dans les années qui suivent, avec les travaux importants de reprofilage des berges et les créations de bassins écrêteurs. Les crues suivantes et ou plus prosaïquement, les méthodes de fauches par broyages multiplient les foyers.

Zones envahies en 2008



➡ En 2008 une première cartographie permet un état des lieux (cf plaquette « Formans Morbier rivières menacées ». On note une contamination en aval mais aussi de larges zones envahies en amont. Les zones naturelles et non modifiées semblent encore partiellement épargnées. Mais la pression, s'accélère et désormais des secteurs de rypisilve au couvert végétal denses semblent en voie de contamination.

➡ Plusieurs zones envahies en dehors des circulations d'eaux et des zones humides sont aussi mentionnées. Au rythme actuel de la propagation, et sans mesure particulière un doublement des surfaces envahies sera effectif tous les 4 ans.

➡ Il est désormais illusoire de vouloir éradiquer cette envahisseuse, Quelques actions de préventions et de 'bon sens' peuvent limiter son développement. Celles ci passent par une meilleure connaissance de la physiologie et du cycle végétatif de la plante, et la diffusion de ces informations aux riverains, aux collectivités locales, aux associations et à l'ensemble des acteurs susceptibles d'intervenir sur la renouée. (coupe en période chaude et sèche, coupe nette d'épuisement et non dissémination des morceaux de taille et déchets, etc...)

L'association AGESEF en collaboration avec le ETBP Saône Doubs c'est lancé dans un programme d'information. Une journée technique intercommunale sera programmée pour l'automne 2008



Première phase d'implantation sur une prairie naturelle en bordure du Morbier (2008)